

Fișa de informații cu caracter tehnic

ZAGOR PASTA

Momeală cu efect imediat pe bază de Brodifacum. Eficient împotriva tuturor rozătoarelor, chiar și acelor rezistente la atacul altor anticoagulante

Compoziție, 100 de grame de produs conțin:

Brodifacum pur	0,005 g
Benzoat denatonium	0,001 g
Zaharuri, grăsimi vegetale, uleiuri, făină arome alimentare și conservanți	100 g

Familia BRODIFACUM	Derivat al Hidroxidului de cumarină
Mod de acționare	Doză unică
Acțiunea	Inhibă secreția de vitamină K1 și alterează activitatea factorilor de coagulare sangvină
Specii aflate sub control	Rattus rattus, Rattus Norvegicus, Mus Musculus, șoareci de câmp

Benzoat de atoniu, denumire chimică	Benzodietilenă(2,6 carbat de xilen) benzoat de amoniu
Mod de operare	Prin îngurgitare
Acțiune	Substanța are un pronunțat gust amar
Speciile care nu o detectează, în cazul unei concentrații de 0,001 g la 100 g de momeală	Rattus rattus, Rattus Norvegicus, Mus Musculus, etc.

Formulă de prezentare

ZAGOR PASTA se prezintă sub formă de pastă momeală, în cantitate de 15 g, fiecare doză, pastă ce se obține prin amestecarea unor ingrediente diverse precum: făină, zaharide, grăsimi animale și vegetale, arome sintetice și conservanți. Pasta momeală conține benzoat denatoniu, ingredient care îi conferă un gust extrem de amar și descurajează orice tentativă din partea copiilor și animalelor de companie de a o ingera accidental. Caracteristica specifică a benzoatului denatoniu o constituie faptul că acesta nu este detectat de către rozătoare, prin vâul palatin, la concentrații specifice. Momelile tip pasta sunt caracterizate printr-o excelentă calitate a gustului și valoare nutritivă. De aceea se recomandă pentru ținerea sub control a numărului rozătoarelor din diferite medii, mai ales dacă acestea există în apropierea unor surse generoase de hrană.

Speciile care pot fi controlate

ZAGOR PASTA este acceptata și consumat de toate tipurile de rozătoare infestante: *Rattus norvegicus*, *rattus rattus*, *mus musculus*, *apodemus sylvaticus*, *microtus arvalis*, etc.

Proprietăți

Brodifacum aparține celei de –a doua generații de anticoagulanți indirecti. Caracteristica sa principală, comparativ cu substanțe precum Bromadiolul sau Difenacum, este dată de toxicitatea acceptabilă pentru animale precum câinii sau pisicile. Prin urmare este eficient pentru controlul populațiilor de rozătoare din zonele urbane de largi dimensiuni. Brodifacum este activ în mod ireversibil chiar și asupra acelor specii de șobolani și șoareci care au dezvoltat imunitate la warfarină și alte anticoagulante. După ingestie, rozătoarele mor fără a suferi și fără a crea panică în rândul indivizilor din populația vizată de exterminare, care continuă să se hrănească cu substanța activă.

Dozaj la utilizare și modalități de utilizare

Așezați câte 2 – 6 momeli în cutii de unică folosință, cu această destinație, sau alți recipiente adecvați pentru a proteja celelalte animale de îngurgitarea nedorită a raticidului. Momelile trebuie plasate cât mai aproape de locurile infestate, pe cât posibil în apropierea locurilor de hrănire, sau, la alegere, de-a lungul zidurilor, în locurile în care au lăsat urme, aproape de adăposturile săpate în pământ, la colțuri și sub grămezile de materiale. Verificați pozițiile momelilor plasate, la fiecare 8 – 10 zile și puneți o nouă cantitate sau întregiți-o pe cea veche, dacă considerați necesar. Rozătoarele moarte trebuie arse sau îngropate pentru a evita alte acțiuni de otrăvire secundară. Prezența momelilor ar trebui semnalată prin plasarea de semne de avertizare.

Toxicitatea ingredientelor activi

Difenac este extrem de toxic pentru rozătoare, dar poate afecta, moderat, alte câteva mamifere:

LD50 doza orală de atac pentru masculul șobolan 1,8mg/kg

LD50 doză orală de atac pentru masculul șoarece 0,80mg/kg

LD50 doză orală pentru câine 50mg/kg

LD50 doză orală pentru pisică 100 mg/kg

Atenție

În vederea utilizării corecte a acestui produs, urmați instrucțiunile furnizate în eticheta produsului. Citiți și păstrați fișa de prezentare a produsului (de punere pe piață a produsului). Nu contaminați oamenii, animalele, alimentele, hrana, băuturile sau recipientele de păstrare ale acestora cu produsul de față. Producătorul nu-și asumă nici un fel de răspundere față de terți. Utilizatorul este responsabil de orice vătămări rezultate din utilizarea defectuoasă a produsului. Antidotul specific pentru acest produs este vitamina K1.