



ADDICT® GEL

GEL MOMEALĂ ÎMPOTRIVA GÂNDACILOR GATA DE FOLOSIRE

Compoziție

Dinotefuran (CAS 165252-70-0): 2% masic/masic
Numărul autorizației: RO/2020/0275MRS/UK-0011870-0000
(LODI S.A.S. Franța)

Puncte forte

- Nou activ
- Generație nouă
- Ucidere mai rapidă
- Nu se cunoaște nicio rezistență
- Compatibil cu practicile de Gestionare integrată a dăunătorilor (IPM)

Niveluri de aplicare

Numai pentru uz în interior. Pentru utilizare în clădirile comerciale și industriale, în gospodării și în zonele private și publice (adică spitale și aziluri). Aplicați direct în crăpături sau numai ca tratament local.

Gândac german (croton): aplicați 2 x 0,1 g gel momeală pe metru pătrat
Gândac negru de bucătărie: aplicați 4 x 0,1 g gel momeală pe metru pătrat

Dublați nivelul aplicării, în cazul infestării grave.

În gospodărie aplicați gelul momeală în maximum 16 puncte, respectiv până la 72 la tratarea zonelor comerciale, industriale sau publice.
Poate fi necesară reaplicarea, la 7 zile de la tratamentul inițial.

Instrucțiuni de utilizare

Pentru a aplica gelul, scoateți capacul duzei, atingeți vârful acesteia de suprafața de tratat și apăsați ușor pistonul.

Reaplicați în funcție de nivelul infestării rămase și când momeala nu se mai vede. Puneți la loc capacul, pentru depozitarea produsului.

Folosiți numai ca tratament local, în zone care nu sunt accesibile, nu vor fi scufundate în apă și unde momeala nu poate fi îndepărtată când se face curățenia de rutină. Pentru a menține atractivitatea produsului, aplicați departe de sursele de căldură.

Metoda de aplicare locală: scoateți capacul din vârful tubului aplicator. Puneți vârful în locul în care va fi aplicat gelul.

Apăsați pe piston, până când iese cantitatea dorită. Puneți la loc capacul, după ce terminați aplicarea gelului.

Metoda de aplicare în crăpături: gelul momeală trebuie aplicat direct în crăpăturile în care se ascund insectele. Puneți vârful aplicatorului direct în crăpătură și aplicați gelul.

Momeala trebuie să fie într-o zonă goală și nu pe suprafețe deschise sau expuse.



Ambalaj

Cutie cu 4 tuburi de 30 g

Instrucțiuni privind PRIMUL AJUTOR

Ingerare: clătiți gura cu apă. Solicitați imediat asistență medicală. Induceți vomă, conform indicațiilor personalului medical. Niciodată nu dați ceva pe gură unei persoane înconștiente sau care are convulsii.

Inhalare: dacă nu vă simțiți bine, mutați-vă imediat la aer curat. Solicitați asistență medicală dacă tușiți sau dacă apar alte simptome. Dacă persoana nu respiră, faceți respirație artificială. Dacă respiră cu dificultate, puneți persoana pe oxigen.

Contact cu pielea: scoateți imediat hainele și încălțămintea contaminate. Clătiți pielea și spălați-o cu cantități mari de apă. Dacă apar simptome, apelați la un medic.

Contact cu ochii: clătiți imediat cu apă din abundență. Desfaceți cu degetele pleoapele, pentru a clăti complet. Verificați prezența lentilelor de contact și scoateți-le, dacă puteți face aceasta cu ușurință. Dacă iritația persistă, apelați la un medic.

Precauții personale: purtați EIP.

Protecție pentru ochi/față: ochelari de siguranță.

Protecție mâinilor și corpului: mănuși rezistente chimic, cască de siguranță, haine de protecție, cizme de protecție.

Protecție respiratorie: aparat de respirat cu cartuș chimic.

SE VA UTILIZA NUMAI DE CĂTRE OPERATORI PROFESIONIȘTI.
ÎMPIEDICAȚI ACCESUL copiilor și animalelor LA MOMEALĂ.

NU SE VA UTILIZA acolo unde se pot contamina alimentele, hrana sau apa.

Spălați mâinile și pielea expusă, înainte de masă și după folosire.

PĂSTRAȚI ÎNTR-UN LOC SIGUR.

NU LĂSAȚI la îndemâna copiilor.

NU APLICAȚI ÎN SCURGERI SAU ÎN APROPIEREA ACESTORA.

NU APLICAȚI produsul în zone ușor accesibile copiilor sau animalelor.

NUMAI PENTRU UZ ÎN INTERIOR.

NU contaminați fluviile, râurile sau cursurile de apă cu produsul sau recipientele folosite.